

SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE MAI 1948

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une température moyenne de 20°3, soit supérieure à la moyenne qui est de 18°3.

Les températures extrêmes ont été de 32°3 pour les maxima et de 9°8 pour les minima.

La pluviométrie a été supérieure à la normale et les principales précipitations ont été :

Kroumirie - Nefzas	39 m/m 7
Béja - Mateur	61 m/m 5
Vallée Medjerdah basse	49 m/m 4
Région de Tunis	55 m/m 1
Cap-Bon	147 m/m 5
Sahel d'Enfidaville	38 m/m 5
Sahel de Sousse	13 m/m 2
Sahel de Sfax	14 m/m 3
Steppes basses septentrionales	64 m/m 3
Steppes basses méridionales	23 m/m 5
Région présaharienne	gouttes

Des orages de grêle ont été enregistrés au cours de ce mois à Ras-Djebel, Béja, Mateur, M'Rira, Fouchana, Bordj-Chakir, Henchir Solta-ne et Aïn-Kerma.

Le siroco a sévi dans les régions de Tabarka, Tunis et Thala le 9 mai, à Fériana, Djerba, Zarzis et Médenine le 10 mai, et à Tabarka, Souk-el-Arba, Tunis, Thala, Sousse, Djerba, Zarzis et Médenine, le 12 mai.

Au nord de la Dorsale, la moisson de l'orge et des blés tendres a été commencée vers le 20 mai, fortement gênée par les circonstances atmosphériques et les mauvaises herbes.

Les rendements sont faibles dans la région de Zaghouan, le Sud des Contrôles Civils de Tunis et de Na-beul, moyens ou bons dans les autres régions, sauf dans le Sud du Contrôle civil de Medjez-el-Bab et

Maktar et dans la plaine de Siliana.

Des attaques de rouille, de charbon et de piétin ont été signalées dans les parties basses à Béja.

Au sud de la Dorsale, la récolte de céréales est supérieure aux prévisions, notamment dans les zones irriguées.

À la suite de fortes attaques de pucerons, la récolte de fèves est moyenne ou médiocre dans le Nord.

Les pois chiches ont une belle végétation. Toutefois, des dépressions de la végétation attribuées à la Mélanore ont été signalées.

La récolte des fourrages, abondante dans l'ensemble, est terminée. La fenaison a été considérablement gênée par les pluies du mois et la qualité est médiocre. À Béja, le rendement moyen est de 28 à 30 quintaux à l'hectare.

La saison a été propice à la végétation des betteraves fourragères, qui n'est malheureusement cultivée que sur une petite échelle.

Le sorgho fourrager présente une belle végétation, ainsi que les cactus inermes, dans les régions du Centre.

Les pluies de mai ont assuré une abondante floraison dans les principales régions viticoles, mais ont nécessité quatre à cinq traitements préventifs contre les maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium) dans le Cap-Bon et la région de Bizerte.

Dans l'ensemble, la récolte s'annonce abondante sur les jeunes vignes reconstituées. Des dégâts causés par l'érosion ont été enregistrés dans les vignobles de co-teau du Cap-Bon.

L'état de végétation des oliviers est excellent; la floraison très abondante laisse entrevoir une bonne récolte, sauf dans la région nord de Zaghouan.

Dans la région sfaxienne, la floraison des oliviers s'étant échelonnée sur deux mois, la nouaison a été mauvaise; la psylle et la teigne ont de plus occasionné d'importants dégâts.

Les variétés locales d'arbres fruitiers ont conservé peu de fruits. Les variétés américaines, plus tardives, sont plus régulièrement chargées.

La floraison des amandiers a été satisfaisante.

Les variétés espagnoles d'abricotiers promettent une belle récolte.

On constate presque partout une mauvaise végétation des pêchers. Cet état de choses est dû à la sécheresse du printemps, consécutive à un hiver trop doux; les départs de végétation se sont faits dans les parties basses et aux extrémités, laissant dégarnie une partie des rameaux.

La fécondation des palmiers dattiers s'est effectuée d'une façon satisfaisante dans le Djérid.

Les légumes de saison sont abondants. Les pommes de terre donnent de bons rendements dans le Cap-Bon. La cochenille du melon et les noctuelles ont causé des dégâts aux cucurbitacées et le puceron vert aux piments.

La récolte du lin est terminée. Les rendements sont faibles ou nuls dans la région de Tunis et le sud du Cap-Bon, mais assez bons dans les autres régions du Nord et dans le Sahel. Le plus souvent, l'arrachage

a dû être exécuté à la main, les tiges étant très courtes.

Le tabac présente une bonne végétation dans le Cap-Bon.

Les plantes condimentaires telles que carvi, coriandre, nigelle et cumin, dont la superficie a été doublée, promettent une bonne récolte.

Les pâturages sont abondants ou suffisants sur toute l'étendue du territoire.

L'état d'entretien du bétail est satisfaisant. La tonte des moutons, en cours dans le Nord, est terminée dans le Centre et le Sud.

L'état sanitaire du bétail est généralement bon. Toutefois, quelques cas de diarrhée ont été signalés sur les ovins nouvellement tondus, dans la région de Sousse.

Une légère hausse sur le prix du bétail a été enregistrée sauf à la frontière algérienne où 5% de baisse ont été constatés.

Une tendance à la baisse sur les légumes a été signalée dans le Nord.

Les transactions immobilières ont été peu nombreuses, sauf dans la région sfaxienne où un certain nombre de propriétés importantes seraient en cours de vente.

Le prix de la journée d'ouvrier agricole varie actuellement de 80 fr. par jour dans le Sahel à 130 fr. dans le Cap-Bon.

La situation économique s'est nettement améliorée dans toute la Régence.